40FIT
TECHNOLOGY
STARKE KÄLBER
STARKE KÜHE

40FIT Technology

Füttern nach dem Vorbild der Natur

4 Stunden

14 Tage

40+ Tage

Abtränken

ColostroFIT

MilchMobil oder CalfRail

Tränkeautomat und Erweiterungen

Kraftfutterautomat

Füttern nach dem Vorbild der Natur

4 Stunden

14 Tage

40+ Tage

Abtränken

ColostroFIT

MilchMobil oder CalfRail

Tränkeautomat und Erweiterungen

Krafffutterautomat

2004/2005

2015

- ausreichend versorgt [≥ 10 mg]
 - unterversorgt [5-9,9mg]
 - stark unterversorgt [< 5 mg]
- (Ig /ml Serum)

(Stemme et al., 2016)

Ca. 60% der Kälber sind nicht ausreichend geschützt

- Körpereigene Antikörperproduktion erst nach ein paar Tagen

- Antikörperkonzentration im Kolostrum sinkt schnell

So schnell wie möglich MELKEN !

- Aufnahmefähigkeit von Antikörpern sinkt schnell

So schnell wie möglich FÜTTERN!

- Spindel (Kolostrometer) oder Refraktometer
 - Mind. 50 mg IgG/ ml

	Kolostrometer	Refraktometer	
Gute Qualität	Grüner Bereich (Dichte >1045 g/l)	>21 Brix%	>1,3638 (RI)
Mittlere Qualität	Gelber Bereich (Dichte 1035–1045 g/l)	21-18 Brix%	1,3638 - 1,3605 (RI)
Schlechte Qualität	Roter Bereich (Dichte <1035 g/l)	<18 Brix%	<1,3605 (RI)

(Kolostrumqualität per Refraktometer bestimmen, LW33/2013)

- Keine negativen Auswirkungen auf die Antikörper im Kolostrum
- Reduziert den Keimgehalt im Kolostrum
- Verbessert die Übertragungsrate um mehr als 20%
- Führt zu einer besseren IG-Gesamtversorgung

Antikörperaktivität

Transferrate

ColostroFIT – Viel ... hilft viel

	2 Liter	4 Liter	Effekt
Kälberzahl	37	31	
Tierarztkosten [\$]	24,5	14,77	↓
Zunahmen/Tag [g]	800	1030	↑
Erstbesamungsalter [Monate]	13,97	13,54	↓
Leistung Laktation [kg]	16010	17040	↑
Abgangsrate [%] 1+2 Laktation	24,3	12,9	↓

(nach Faber et al. 2005)

Positiven Effekt nutzen!

- Der Labmagen des Kalbes fasst nur 2 Liter
- Trotzdem 4 Liter Kolostrum füttern (10% vom Körpergewicht)
 - Labmagen nicht der Bestimmungsort des Kolostrums
 - Endhaltestelle = Darm
 - dorthin soll so viel unverdaute Biestmilch wie möglich gelangen
 - nur im Darm können die Immunglobuline über die Darmwand in den Blutkreislauf übertreten.

ColostroFIT - Konzept

Die mit Abstand wichtigste Maßnahme ist die rechtzeitige Gabe von ausreichend Kolostrum in hoher Qualität!

- Kolostrum-Managementsystem für die Erstversorgung eines Kalbes
 - Gewährleistet den optimalen Start ins Leben
 - Bildet die perfekte Basis für eine gesunde und leistungsstarke Milchkuh

Füttern nach dem Vorbild der Natur

4 Stunden

14 Tage

40+ Tage

Abtränken

ColostroFIT

MilchMobil oder CalfRail

Tränkeautomat und Erweiterungen

Krafffutterautomat

Geburt

40 Tage - Zellvermehrung

Abtränken - Zellwachstum

Intensive
Fütterung

Restriktive
Fütterung

Verdauungssystem

Weitere Organe

- Für eine gesunde Hochleistungs-Kuh ist vieles entscheidend.....

Das Euter
Mehr Milch am Ende

Das Herz
Keine Milch ohne Bluttransport

Das Verdauungssystem
Für eine gute Futterverwertung

Die Lunge
Für eine ausreichende Sauerstoffversorgung

Die Leber
Für einen guten Stoffwechsel

Geringeres Wachstum bei verminderten Zunahmen (Kälber bis 50 Lebenstagen)

Bis 40% mehr stoffwechselaktives Gewebe

- Kälber mit intensiver Milchfütterung haben 50% mehr Parenchym!

(P = 0.03; Table 1). Also, calves fed the H diet compared with those fed the M diet from 2 to 8 wk of age had 50% more parenchyma (per kg of BW) at 14 wk, regardless of which diet was consumed from 8 to 14 wk of age (P = ...)

Woche 2 bis 8 - Milchfütterung

Woche 9 bis 14 - Festfutter

■ Tränkeaufnahme

Mehr Milch am Anfang!

■ Kraftfutterverzehr

Mehr Kraftfutter am Ende!

Tränkeplan

Bis zum 30.Tag:
MAT mit 21% Protein (40%
Magermilchpulverprotein),
20% Fett

Nach dem 30.Tag:
MAT mit 22% Protein (20%
Magermilchpulverprotein),
20% Fett

Tränkeabruf

Durchschnittliche Tränkeaufnahme
in den ersten
35 Tagen:

- 40FIT ca. 11 Liter
- Kontrollgr. ca. 6 Liter

Besuchshäufigkeit am Tränkeautomat ohne Tränkeanrecht

(nach N. Jurkewitz 2012)

Ø Besuche in 40FIT Phase:
Versuchsgruppe (40FIT)
= 1,5 Besuche
Kontrollgruppe (restriktiv)
= 13 Besuche

Weniger Stress für mehr Wachstum!

Tageszunahmen und Gesamtkörpergewicht

Mehr Milch – bessere Zunahme!

	Versorgungsniveau		Signifikanz
	Niedrig	Hoch	p
Erkrankungen pro Jahr	32,1 %	12,1 %	0,01
Erkrankungen im Sommer	12,7 %	4,4 %	0,02
Erkrankungen im Winter	52,4 %	20,4 %	0,01

(Godden et al., 2005)

Untersuchungen	Ergebnisse
Foldager and Krohn, 1994 (Dänemark)	+ 1.402 kg
Foldager et al., 1997 (Dänemark)	+ 519 kg
Bar-Peled et al., 1998 (Israel)	+ 454 kg
Ballard et al., 2005 (USA, NY)	+ 700 kg
Davis Rincker et al., 2006 (USA, MI)	+ 499 kg
Drackley et al., 2007 (USA, IL)	+ 835 kg
Chester-Jones et al., 2009 (USA, MN)	+ 998 kg
Soberon et al. 2011 (USA)	+849 kg
Broghammer, 2015 (Deutschland)	+1.266 kg
Durchschnitt	+ 836 kg

40FIT – warm und frisch für beste Ergebnisse

25 Kälber/ Gruppe MAT: 26% Protein 16% Fett	2x2 l/Tag warm	ad libitum kalt angesäuert	ad libitum warm süß
Tageszunahmen Tränkeperiode [g]	530	780	1040
Tageszunahmen 7.-12. Woche [g]	800	820	820
Lebendmasse vor Kalbung [kg]	634	652	659
305-Tage-Leistung 1. Laktation [kg]	26,6	27,6	28,6
Zwischenkalbezeit 1.→2. Lakt.. [Tage]	405	394	376

(Aikmann et al., 2015)

Füttern nach dem Vorbild der Natur

- Rechtzeitig, ausreichend & hochwertiges Kolostrum
- Häufig (>3 mal am Tag)
- Kleine, altersgerechte Portionen
- Frisch zubereitet
- Warm, mit exakter Temperaturführung
- Kontrolliert je Abruf
- Mehr Energie bei kalten Temperaturen

Kolostrum

40 FIT

- Kontrollierte ad-libitum Fütterung
- Jedes Kalb wird separat überwacht
- Freie Tagesmenge mit Begrenzung pro Besuch
- Hinterlegte Gruppen- & Einzeltieralarme

Abtränken

- Anschließendes kontrolliertes Abtränken
- Genügend Kraftfutter und Heu anbieten

- Nach der Geburt eines Kalbes ist nur der Labmagen voll funktionsfähig
 - Die Kapazität des Labmagens ist begrenzt

Vormägen	ca. 0,75 Liter	ca. 14 Liter	ca. 90 Liter
Labmagen	ca. 2 Liter	ca. 7 Liter	ca. 10 Liter
Alter	einige Tage	12 Wochen	1 Jahr

(Tabelle Jilg, 2006)

(43. Tage altes Kalb)

- Der Tränkeautomat kann so viele Portionen anrühren wie sie möchten
 - Portionsgröße ist einstellbar
 - Minimum: Satt nach der Fütterung – Verhindert gegenseitiges Besaugen und Stress!
 - Maximum: Kein Übersaufen
- Wartezeiten zwischen den Fütterungen

- optimale Tränketemperatur
 - Anpassung der Temperatur an die Umgebung
 - durch Sensoren in Boiler und Mixer
 - schafft beste Gerinnungsbedingungen
 - unterstützt den Schlundrinnenreflex

Temperatur	Gerinnung
39°C	2-3 min
35°C	5 min
30°C	8 min
25°C	12 min

Für eine optimale Verdauung!

- Tränkeverabreichung über Nuckel
 - Kälber trinken langsamer
 - Erhöht Speichelbildung
 - Unterstützt Schlundrinnenreflex

- **tierindividuelle** Fütterung
 - bis zu 4 Fütterungspläne
 - Zu- oder Abschläge auf Menge oder Konzentration
- **entwicklungsabhängiges** Abtränken
 - **individuelles** Abtränken dank Anbindung von Kraftfutterautomat oder Halbwaage
- Fütterung rund um die Uhr!

Denn jedes Kalb ist anders!

- Kälber brauchen mehr Energie während kalten Temperaturen
- automatische Anpassung der Tränkezusammensetzung je nach Umgebungstemperatur
 - Konzentration oder Tagesmenge

Mit sinkender Temperatur steigt der Energiebedarf!

40FIT ist ein Programm, in dem

- Fütterungstechnik
- Futtermittel
- Haltungsbedingungen
- Tiermanagement

so kombiniert werden, dass das Wachstumspotential der Kälber in den ersten Lebenswochen maximal ausgeschöpft wird.

Für ein gemeinsames Ziel

- Technikhersteller
- Futtermittelhersteller
- Berater
- Landwirte

Unsere 40FIT Partner

- Viele Kälber werden in den ersten 2-3 Lebenswochen noch in Einzelhaltung gehalten

Manuell?

Automatisch?

- 2 bis max. 3 Mal am Tag füttern
- Fütterungsvorbereitung auf Vorrat
- Fütterung im Nuckeleimer
- Hoher Arbeitszeitaufwand

Manuell = MilchMobil

- Unterstützt das natürliche Verhalten
 - Füttern bis zu 8 Mal am Tag
 - Kleine Portionen immer frisch angerührt
- Kontrollierte Fütterung für optimale Datenverarbeitung

Automatisch = CalfRail

Vergleich verschiedener Fütterungsverfahren

	Natürliche Aufzucht	Eimer (kein Nuckel)	Verfasser & Jahr	Tränkeautomat
Saugzyklen	6000	1000	Scheurmann 1974	
Anzahl der Besuche pro Tag	6 (erster Monat)	2 , max. 3 Mal am Tag	Sambras 1985	6-8 Mal am Tag (40FIT)
Zeit pro Portion	10 min	2-3 min	Sambras 1985	6-10 min (2 Liter)
Gesamtzeit am Tag	60 min -140min (erster Monat)	5-6 min	Sambras 1985/ Jensen et al. 2002	36 min - 80 min

Gruppenhaltung

- Für ein gutes Stallklima mit ausreichend Platz sorgen
- Ausreichend Futter in hoher Qualität (40FIT Futterplan)
- Homogene Kälbergruppen

Fütterungsprinzip

Automatisches Milch-Management – die Lösung

Roboter

Milk Collector

Pasteur

SmartTank

Tränkeautomat

Frischmilchfütterung leicht gemacht.

Für den modernen Kälberstall mit System

HygieneBox

Smart Neckband

Smart Water Station

CalfCloud

- Antibakterieller Nuckel - hemmt Bakterienwachstum
- Geprüft von einem zertifizierten Prüflaboratorium
 - **Deutliche Keimreduktion von über 99%**
- Einfache und kostengünstige Nachrüstung an allen verfügbaren Tränke Stationen und CalfRail

Abbildung 1: linke Agarschale mit Kontrollnuckel, rechte Agarschale mit antibakteriellem Nuckel

Geprüft von einem zertifizierten Prüflaboratorium

YelloTeat

- Rektal gemessene Körpertemperatur von Kälbern und Rindern
- Verbindung zu CalfApp VITAL
 - Alle Daten in der CalfCloud
 - Gesundheitsparameter können über die App aufgezeichnet werden.
- Früherkennung und Intervention bei anstehenden Krankheiten

CalfApp VITAL

Füttern nach dem Vorbild der Natur

4 Stunden

14 Tage

40+ Tage

Abtränken

ColostroFIT

MilchMobil oder CalfRail

Tränkeautomat und Erweiterungen

Kraftfutterautomat

- Große tierindividuelle Unterschiede in der Tierentwicklung
- Abtränken sollte tierspezifisch erfolgen
- Kraftfutterabhängiges Abtränken verhindert Wachstumsdepressionen

- Abtränken entsprechend der Pansenentwicklung
- Kraftfutterabhängiges Abtränken möglich (Start- und Endwert)
 - Kraftfutteraufnahme steuert automatisch für jedes Kalb Beginn und Dauer der Abtränkphase
- Individuelle Fütterung für optimale Tierentwicklung

Abtränken nach Kraftfutterverzehr

Kraftfutterautomat

(ART-Bericht 742,2011)

Hinweis: Bei höheren Tränkemengen ist eine noch größere Depression zu erwarten.

Betriebsgröße – viele Standorte

Kälberverhalten

Gewichte

Temperatur

Technik

Behandlungen

Festfutterverzehr

Prinzip von Cloud Computing

WILLKOMMEN
IM KÄLBER-
FITNESS-CENTER.

40FIT
TECHNOLOGY

Für Fragen oder Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung:

Förster-Technik GmbH

Gerwigstraße 25

78234 Engen

+49 7733 94060

info@foerster-technik.de

Verzichtserklärung

Einige Produkte sind möglicherweise in gewissen Ländern nicht verfügbar und lieferbar, auch die Bezeichnungen können sich zu den hier dargestellten unterscheiden. Obwohl die Inhalte dieser Präsentation mit der größten Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernimmt Förster-Technik keine Haftung für jegliche Schäden, die von Fehlern oder Versäumnissen dieser Präsentation entstehen.